

Gerste – Spritzplan 2024



Problem / Zeitpunkt	Wirkungs-Schwerpunkte	Produkt	Bedarf / ha	Bedarf	Bemerkung		
(Winter-) Gerste (konventionell) _____ ha							
Herbst	Vor- oder Nachauflauf bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser unterstützt die Gräserwirkung	Aduka + Arlit	0.6 l + 1-2 l		Bei resistentem Ackerfuchsschwanz oder Windhalm die Tankmischung (0.6 l Aduka + 2 l Arlit) einsetzen. Auf ein feuchtes, feinkrümeliges Saatbeet applizieren. Kein Frost vor und nach der Behandlung.	
	Nachauflauf (1-3-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser unterstützt die Gräserwirkung	Trinity* + Arlit	2 l + 1-1.5 l	*		
	Nachauflauf (2-4-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser inkl. Raigras-Horste	Trinity* + Grant	2 l + 0.9 l	*		
Frühjahr - Herbizid Korrektur-Behandlungen oder Frühjahr-Strategien siehe bei Extenso-Varianten (min. 5 Tage Abstand zum Verkürzen)							
1	1-Fungizid-Strategie	Blatt- / Ährenkrankheiten	Bronco Top *	2 l	*	Fahnenblatt (bevor Grannen / Ähre sichtbar)	
		Blatt- / Ährenkrankheiten	oder Casac	oder 1 l			
		Halmverstärkung	+ Elotin	0.75 l			
1	Fungizid mit Halmverkürzung	Blattkrankheiten + Mehltau	Bronco Top	2 l	*	1-Knoten-Stadium bei Temperaturen: tags >12-14° nachts > 8°	
		Halmverkürzung	+ Milo	0.5 l			
		Halmverkürzung	+ Elotin	0.4 l			
2	Fungizid mit Ährenstielverkürzung	Blatt- / Ährenkrankheiten	Casac	1 l		Fahnenblatt (bevor Grannen / Ähre sichtbar)	
		Halmverstärkung	+ Elotin	0.75 l			
Zu jeder Fungizid-Spritzung (trockener Bestand) 3 l Sulfix + 5 kg Combitop zugeben					Bei Temperaturen < 23°		
1	= 1-Fungizid-Strategie nur für standfeste Sorten						
1 + 2	= 2-Fungizid-Strategie (mit Halmverkürzung) für alle ertragreichen Sorten, die zur Lagerfrucht neigen.						

(Winter-) Gerste (extenso) _____ ha							
Herbst	Vor- oder Nachauflauf bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser unterstützt die Gräserwirkung	Aduka + Arlit	0.6 l + 1-2 l		Bei resistentem Ackerfuchsschwanz oder Windhalm die Tankmischung (0.6 l Aduka + 2 l Arlit) einsetzen. Auf ein feuchtes, feinkrümeliges Saatbeet applizieren. Kein Frost vor und nach der Behandlung.	
	Nachauflauf (1-3-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser unterstützt die Gräserwirkung	Trinity* + Arlit	2 l + 1-1.5 l	*		
	Nachauflauf (2-4-Blatt der Gerste) bis und mit 14. Nov.	Unkraut + Ungräser inkl. Raigras-Horste	Trinity* + Grant	2 l + 0.9 l	*		
Frühjahr	Gräser ohne Unkraut	Ungräser (ungenügend auf einj. Rispe)	Grant	1.2 l			
	Einjährige Rispengras	einjährige Rispe + Unkraut	Zepter	200 g		bis BBCH 32 (2-Knoten) >15°	
	Kor.: Blacken, Disteln, Mohn, Raps	Unkraut (ohne Klebern, Winden)	Biplay SX*	45 g	*	bis BBCH 32 (2-Knoten) >15°	
	Kor.: Klebern, Blacken, Taubnessel	Unkraut (ohne Disteln, Raps)	Pixxaro EC	0.5 l		bis BBCH 39 (Fahnenblatt) > 5°	
	Kor.: Klebern, Disteln	Unkraut (ohne Ehrenpreis, Taubnessel)	Starane XL	1.8 l		bis BBCH 39 (Fahnenblatt) >15	
	Kor.: Blacken, Winden, Klebern	Unkraut (ohne Ehrenpreis, Taubnessel)	Hoestar	40 g		bis BBCH 49 (Ähreschieben) >15°	
	Breite Tankmischung auf Unkräuter und Ungräser	Ungräser	Grant	1.2 l		bis BBCH 32 (2-Knoten) breite, komplette Tankmischung mit vitalisierender Blattdüngung	
	div. Unkräuter	+ Biplay SX*	25 g	*			
	Schwefeldüngung	+ Sulfix	3 l				
	Blattdüngung Mg, S, Mn, Zn	+ Epsa Combitop	6-8 kg				

Produkte mit Anwendungs-Auflagen	SPe 1 / SPa 1 (Wirkstoff-Mengen-Einschränkungen)	Spe 2 (Anwendungs-Verbote)			Spe 3 (Wasser-Abstands-Auflagen)	
	Einsatz / Jahr (Jahre)	S2	Sh	Karst	Abdrift	Abschwemm
Trinity	-	X	-	-	20 m	1 Punkt
Biplay SX	Verkauf bis 01.10.2026 / aufbrauchen bis 01.10.2027	-	-	-	-	1 Punkt
Bronco Top	max. 1 Behandlung (SDHI) / Jahr	-	-	-	6 m	1 Punkt
Aduka		-	-	-	6 m	2 Punkte

Unabhängig vom Produkt muss im ÖLN zur Verminderung von Abdrift und Abschwemmung mindestens 1 Punkt erreicht werden.