

Wetter

Heute meist bewölkt aber trocken. Heute Nacht teils kräftige Regenschauer mit Gewittern. Morgen am Dienstag und Mittwoch wieder freundlich und nochmals recht mild. Ab Donnerstag wieder regnerisch und deutlich kühler. Zum Wochenende liegen die Höchsttemperaturen auch bei Sonne nur noch um 12 °C. Nachts werden nur noch 5 °C vorhergesagt.

Situation

Bedingt durch die bisher hohen Erntemengen bei den einzelnen Sorten schiebt sich die Ernte bei vielen Betrieben etwas nach hinten. Die rote Deckfarbe ist auf Grund der idealen Witterung durch die kalten Nächte heuer bei allen Sorten extrem gut und intensiv ausgebildet, so dass man jetzt den Eindruck hat alle Sorten könnten jetzt gleichzeitig geerntet werden.

Die innere Reife ist aber bei den späteren Sorten wie Braeburn und Magicstar noch nicht erreicht. In dieser Woche werden Topaz, Red Prince, Novajo, Greenstar bzw. Golden überpflückt.

Ende dieser Woche rechnen wir mit dem Erntebeginn in jungen Evelina und Kanzi-Anlagen.

Die neue Sorte Wurtwinning (Bloss) zeigt jetzt ebenfalls bereits die sortentypische Aufhellung der Grundfarbe. Die Ursache der heuer in vielen Anlagen vorhandenen Greenspötflecken ist weiterhin ungeklärt. Tatsache ist aber dass der Ausfall durch die grünen Flecken und die in Folge aufgesprungenen Früchte deutlich zu hoch ist um die Sorte uneingeschränkt weiter zu pflanzen.

Der Lizenzinhaber ist jetzt gefordert das Problem zu lösen und die Anbaubedingungen zu ermitteln um dieses Auftreten in den Griff zu bekommen.

Spätschorf u. Lagerschorf

Bisher findet man nur wenig frische Spätschorfflecken auf den Früchten die jetzt zur Ernte anstehen. Den meisten Spätschorf findet man bisher nur auf der Blattunterseite. Um den Druck nicht ins Lager mit zunehmen ist bei den anfälligen Sorten weiterhin eine Spritzung mit einem Belagsfungizid wie Captan sinnvoll. Unter Beachtung der Wartezeit ist dies aber jetzt nur noch bei ganz späten Sorten wie Braeburn bzw. Cameo möglich.

Als Abschlussbehandlung gegen Fruchtfäulen empfehlen wir bei den für Gloeosporium anfälligen Sorten wie Pinova, Golden und Kanzi eine Abschlussbehandlungen mit Geoxe mit 0,15 kg/mKh (WZ: 3 Tage max. 2 Anwendungen) oder bei den anderen Sorten Flint mit 0,05 kg/mKh (Wartezeit nun 14 Tage, bei alter Ware 7 Tage).

Als Zusatz zur Stippvorbeugung empfehlen wir weiterhin: Kalziumchlorid Schuppen mit 1,5 kg/mKh;

Nacherntebehandlung abgeerntete Äpfel

Die Elstar und Gala-Anlagen sind nun abgeerntet. Soweit es die Witterung noch erlaubt empfehlen wir ihnen die Blütenknospen besonders die Elstarparzellen mit hohem Ertragsniveau jetzt nochmals durch eine Blattdüngung zu stärken. Falls die Temperaturen im Bereich von 20 °C liegen kann auch der Zusatz von Cerone sinnvoll sein.

Folgende Mischung wird empfohlen:

Zink und Bor mit je 0,5 l/ha plus Harnstoff 10 kg/ha plus Cerone 0,25 l/mKh plus Captan (zur Abdeckung der Wunden die bei der Ernte entstanden sind)

Unkrautregulierung nach der Ernte

Wie in den Vorjahren sollte zügig nach Abschluß der Ernte der einzelnen Sorten der Baumstreifen mit Kyleo (nicht in W-Gebieten erlaubt) abgespritzt werden. Dabei müssen die Wurzelschösser vorher nicht mit Quickdown abgespritzt werden. Die Aufwandmenge von Kyleo sollte aber nicht über 3 l/ha liegen. Mit dem Einsatz von Kyleo nach der Ernte bleibt der Baumstreifen über die Wintermonate bis in die Blüte hinein sauber. Damit kann dann im zeitigen Frühjahr Ende März Anfang April der Einsatz des Bodenherbizids Vorox F auf sauberen unkrautfreien Boden erfolgen. Empfehlung: Nach der Ernte Baumstreifen mit Kyleo 2,5 -3 l/ha abspritzen.

In WSG ist die Kombination aus Select 0,75 l/ha plus Quickdown 0,6 l/ha plus Toil als Alternative möglich. Diese Mischung benötigt allerdings warmes Wetter für eine gute Wirkung!